



ИНСТИТУТ

пластической хирургии
и косметологии

**Информированное добровольное
согласие
Липосакция**



Этот документ призван помочь проинформировать Вас об операции по устранению локальных отложений подкожно-жировой клетчатки на различных участках тела (**липосакция**), ее рисках, а также об альтернативных методах лечения.

Важно, чтобы Вы прочитали эту информацию внимательно и полностью. Пожалуйста, поставьте подпись на каждой странице, указав, что вы прочитали ее и подписали согласие на операцию, предложенную Вашим пластическим хирургом и согласованную с Вами.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕЙ ОПЕРАЦИИ

Липосакция — это хирургическая операция, направленная на устранение локальных отложений подкожно-жировой клетчатки. Липосакция считается объемным и травматичным хирургическим вмешательством. Любая липосакция состоит из двух этапов: первый – это насыщение области операции специальным раствором и второй – это обработка подкожно-жировой клетчатки одним из физических факторов с последующим удалением жировой взвеси при помощи вакуум-отсоса. Для разрушения жировой ткани могут использоваться различные физические факторы: ультразвук, вибрация, лазер, сильный напор жидкости. Операционная травма обусловлена разрушением жировой ткани и ее удалением. При липосакции повреждаются поверхностные кровеносные сосуды и чувствительные нервные окончания. Лучшими кандидатами для липосакции являются здоровые, эмоционально стабильные пациенты, которые имеют реалистичные ожидания относительно того, чего может достичь этот тип операции. После липосакции на коже могут визуализироваться маленькие шрамы около 5 мм длиной.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ

Липосакция – плановая хирургическая операция. Альтернативное лечение может заключаться в отказе от хирургической процедуры и ношении компрессионного нижнего белья для маскировки избытков подкожно-жировых отложений. Также возможно использовать более активные занятия физкультурой, ограничения в питание, различные виды массажа.

РИСКИ ОПЕРАЦИИ

Каждая хирургическая операция сопряжена с определенным риском, и важно, чтобы Вы понимали эти риски и возможные осложнения, связанные с ними. Кроме того, каждая процедура имеет ограничения. Выбор пациента пройти хирургическое вмешательство основан на сопоставлении возможных рисков с потенциальной пользой. Хотя у большинства пациентов эти осложнения не возникают, вам следует обсудить каждое из них со своим пластическим хирургом, чтобы убедиться, что вы понимаете все возможные последствия операции.

Пациент: _____



СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РИСКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛИПОСАКЦИИ.

Изменение чувствительности кожи

У Вас может возникнуть снижение чувствительности кожи в области удаления жировой клетчатки. Частичное снижение чувствительности кожи может произойти после липосакции на любом участке. Восстановление чувствительности происходит самостоятельно, как правило, в течение 2–3 месяцев.

Неровности поверхности кожи

После липосакции могут возникнуть неровности кожного рельефа. Это может быть обусловлено неравномерным, бугристым распределением подкожно-жировой клетчатки в этой области или неравномерностью процесса формирования плоскостного рубца в области выполнения операции. Для коррекции рельефа кожи могут быть использованы различные физиотерапевтические методы в том числе и массаж. При использовании лечения ситуация может улучшиться либо может быть исправлена хирургическим путем. Для этого может потребоваться корректирующая липосакция. В случае необходимости дополнительного лечения или операции возможны финансовые затраты.

Скопление жидкости под кожей (серома)

Одно из наиболее часто встречающихся осложнений, которое хорошо поддается консервативному лечению. Серома представляет собой скопление серозной жидкости между кожно-жировым слоем и фасцией. Ультразвуковое исследование, в некоторых случаях, может использоваться для диагностики сером. Микросеромы бывают у 100% пациентов и клинически себя никак не проявляют и не требуют лечения. Лечение более крупных сером производится при помощи дренирования полости. Лечение проводится амбулаторно. В случае воспаления серомы может потребоваться госпитализация и хирургическое лечение, что повлечет дополнительные финансовые затраты.

Отеки и синяки

После липосакции в этой области будет отек и внутрикожное кровоизлияние (синяк). Выраженность этих проявлений индивидуальная. Как правило внутрикожное кровоизлияние проходят достаточно быстро в среднем в течение 2-х недель, а вот отечность тканей сохраняется достаточно долго и поэтому об окончательном результате липосакции можно судить не раньше 3–6 месяцев после операции. Важным моментом послеоперационного периода является ношение компрессионного белья, которое как раз и предназначено для уменьшения отечности и устранения дискомфорта, связанного с отеком.

Дополнительные рубцы

В некоторых случаях при выполнении липосакции хирургу могут потребоваться дополнительные мини-разрезы для более полного охвата оперируемой области, поэтому есть вероятность, что, например, вместо трех мини-разрезов вам будет

Пациент: _____



сделан дополнительный, четвертый мини-разрез. Как правило, это обсуждается до операции, но иногда такое решение принимается хирургом во время операции.

Объем удаляемой жировой клетчатки

Количество удаляемой подкожно-жировой клетчатки определяется несколькими факторами. Одним из основных является количество примеси крови в удаляемой жировой взвеси. Если это количество минимально, то хирург может безопасно продолжать операцию. Если количество примеси крови в удаляемой жировой взвеси увеличивается, то хирург будет вынужден закончить манипуляцию вне зависимости от объема удаленной жировой взвеси, поэтому до операции нельзя однозначно определить степень уменьшения оперируемой области. Возможно, через некоторое время может потребоваться дополнительная липосакция для удаления большего количества жировой клетчатки.

Образование специфических рубцов

Любая операция оставляет шрамы, некоторые из них могут быть более заметны. При липосакции используются мини-разрезы. После операции рубец подвергается определенным изменениям. Вначале он имеет красный оттенок, может ощущаться зуд. В дальнейшем цвет рубца меняется, он становится бледным, однако он будет отличаться от цвета окружающей кожи. Формирование рубцовой (фиброзной) ткани происходит и под кожей в послеоперационной области. Это проявляется образованием подкожных уплотнений, которые определяются при пальпации. Через некоторое время эти уплотнения проходят самостоятельно. Врач может вам рекомендовать прохождение курса физиотерапии, который ускорит процесс реабилитации и поможет улучшить результат операции.

Повреждение более глубоких частей тела

Во время липосакции существует вероятность повреждения более глубоких структур, включая нервы, кровеносные сосуды, лимфатические сосуды, мышцы, легкие (пневмоторакс), органы брюшной полости. Вероятность повреждения органов брюшной полости возрастает при наличии грыж (вентральных) передней брюшной стенки. Поэтому важно в предоперационном периоде выполнить УЗИ-исследование для выявления грыжевых ворот на передней брюшной стенке.

Влияние будущей беременности на устойчивость результатов операции

Если вы планируете беременность, то в вашей фигуре будут изменения за счет как гормональных, так и за счет алиментарных факторов этого периода. Поэтому при планировании этой операции необходимо учитывать возможные беременности в будущем.

ОБЩИЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ РИСКИ

Определенные заболевания, употребление биологически активных добавок и лекарственных препаратов могут задерживать выздоровление и препятствовать ему. Необходимо сообщить своему хирургу об этом, и он примет решение о продолжении приема этих препаратов или о временной приостановке их приема. Курение приводит к задержке процесса заживления, что может привести к развитию осложнений в послеоперационном периоде и дополнительному лечению.

Пациент: _____



Существуют также общие осложнения, связанные с длительным заживлением, такие как более длительно существующий отек, кровотечение, возможность дополнительной операции, длительное восстановление, изменение цвета кожи, изменения формы, инфекция, несоответствие целям и ожиданиям пациента, а также дополнительные расходы для пациента. В послеоперационном периоде могут возникать различные по интенсивности болевые ощущения. Это связано с повреждением поверхностных чувствительных нервных окончаний при проведении хирургических разрезов, и в дальнейшем они могут быть вовлечены в процесс формирования рубца. Это может привести к формированию болезненной или сверхчувствительной области в послеоперационной зоне. Как правило, с течением времени данный симптом проходит самостоятельно, но в некоторых случаях может потребоваться дополнительное лечение (массаж, физиотерапия, прием лекарственных препаратов). Такое лечение может потребовать дополнительных финансовых затрат.

Кровотечение

Возможно возникновение кровотечения во время или после операции. В случае возникновения послеоперационного кровотечения может потребоваться дополнительная хирургическая операция с целью выявления источника кровотечения и его устранения. В некоторых случаях достаточно дренирования скопившейся крови. В зависимости от объема гематомы врач может назначить переливание крови, хотя такие случаи редки. Скопление крови, которое может образоваться под кожей после операции, называется гематомой. Повышенная физическая активность вскоре после операции может привести к увеличению вероятности кровотечения и необходимости проведения дополнительной операции. Важно следовать послеоперационным инструкциям и ограничить физические нагрузки и напряженную деятельность в течение указанного времени. В зависимости от вида хирургической операции Ваш хирург может назначить лекарства после операции для предотвращения образования тромбов. Эти лекарства влияют на свертываемость крови и могут вызвать повышенную кровоточивость в области операции. Изменения свертываемости крови проходят после отмены этих препаратов.

Инфекционные осложнения

Инфекционное воспаление, хотя и нечасто, может возникнуть после операции. К воспалительным (инфекционным) осложнениям относятся флегмона, абсцесс. В случае возникновения инфекции потребуются дополнительное лечение, включая антибиотикотерапию, госпитализацию и дополнительную операцию. Данное лечение может потребовать дополнительных финансовых затрат. Важно сообщить своему хирургу о любых других инфекциях в анамнезе, таких как инфекции верхних дыхательных путей/пневмонии, фурункул, вросший ноготь на ноге, укус насекомого, воспаление зуба, герпес или инфекция мочевыводящих путей. Инфекции других частей тела могут привести к инфицированию послеоперационной области. Воспалительные осложнения часто приводят к образованию более обширных рубцов и предполагают повторное хирургическое вмешательство.

Пациент: _____



Рубцевание

Некоторые пациенты склонны к образованию гипертрофических или келоидных рубцов, то есть заметных, приподнятых, красных рубцов, которые вызывают эстетический и физический дискомфорт. В этих случаях может потребоваться дополнительное лечение и, возможно, хирургическое вмешательство. Данное лечение может потребовать дополнительных финансовых затрат.

Расхождение послеоперационных швов

Швы могут разойтись после операции. В этом случае может потребоваться дополнительное лечение, включая хирургическое вмешательство.

Анестезия

Как местная, так и общая анестезия сопряжены с риском. Существует вероятность осложнений, травм, развития аллергической реакции, что может потребовать проведения экстренных мероприятий.

Сердечные и легочные осложнения

Легочные осложнения могут возникать вторично из-за тромбов (легочная эмболия), жировых отложений (жировая эмболия), пневмонии или частичного коллапса легких после общей анестезии. Легочная эмболия в некоторых случаях может быть опасной для жизни или фатальной. Важно информировать вашего доктора о прошлых отеках ног и о выявленных тромбозах в прошлом. Сердечные осложнения представляют собой риск при любом хирургическом вмешательстве и анестезии, даже у пациентов без симптомов. Если вы когда-то испытывали одышку, боли в груди или необычное сердцебиение, сообщите об этом вашему доктору. В случае возникновения любого из этих осложнений вам может потребоваться госпитализация и дополнительное лечение.

Венозный тромбоз

Некоторые таблетки с высоким содержанием эстрогена могут увеличить риск тромбоза вен. Важно обсудить со своим хирургом прием противозачаточных лекарств, которые вы используете. Наличие в анамнезе кровотечений и проблем со свертываемостью крови также может увеличить риск тромбоза вен.

Аллергические реакции

В редких случаях сообщалось о местной аллергии на хирургические наклейки, шовный материал, антисептики, препараты крови, препараты местного применения. Серьезные системные реакции, включая шок (анафилаксию), могут возникнуть в ответ на лекарства, используемые во время операции, и назначенные препараты. Аллергические реакции могут потребовать дополнительного лечения. Важно сообщить своему врачу о любых предыдущих аллергических реакциях.

Реакции на лекарства

Пациент: _____



Возможны неожиданная лекарственная аллергия или отсутствие эффективности при назначении лекарственного препарата. Поэтому в некоторых случаях необходимую терапию определяют подбором препарата, оценивая его эффективность. Вам важно сообщить своему врачу о любых проблемах, которые у вас возникли с какими-либо лекарствами или аллергией на лекарства, прописанные или безрецептурные, а также о лекарствах, которые вы сейчас регулярно принимаете. Предоставьте своему хирургу список лекарств и добавок, которые вы в настоящее время принимаете.

Жировая/воздушная эмболия

В редких случаях частицы жира или воздух могут попасть в сосудистую систему, в сердце, легкие или мозг. Это может привести к серьезным осложнениям, включая смерть.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Воздействие солнца (прямое либо солярий)

Воздействие солнца на участки операции может привести к увеличению рубцов, изменению цвета кожи и плохому заживлению. Пациенты, которые загорают на открытом воздухе или в солярии, должны сообщить об этом своему хирургу и либо отложить лечение, либо избегать загара до тех пор, пока хирург не скажет, что возобновление загара безопасно. Повреждающее воздействие солнечных лучей проявляется даже при использовании солнцезащитного крема или защитной одежды.

Путешествия

Любая операция сопряжена с риском осложнений, которые могут замедлить выздоровление и возвращение к нормальной жизни. Пожалуйста, сообщите хирургу о любых планах поездок, чтобы можно было выбрать подходящее время для операции. Нет никаких гарантий, что вы сможете возобновить все виды деятельности в желаемые сроки. Если вам необходимо в ближайшее время после операции совершить авиаперелет, обговорите это со своим хирургом. Он даст Вам нужные рекомендации.

Пирсинг

Если вы используете украшения для пирсинга, которые располагаются в области операции, то их следует снять перед хирургической операцией за несколько дней, так как их присутствие в этой зоне может привести к инфекционным осложнениям.

Ногти

Чтобы определить ваше жизненно важное состояние во время операции, вашему анестезиологу может потребоваться доступ к вашим ногтям для наблюдения. В день операции убедитесь, что по крайней мере на двух ногтях пальцев нет лака или акрила.

Пациент: _____



Ювелирные изделия

Ювелирные изделия не следует брать с собой во время хирургической процедуры. Такие предметы, как серьги, обручальные кольца, ожерелья и так далее следует снять, и положить в безопасное место. Не берите с собой на операцию украшения.

Будущая беременность

Известно, что эта операция не влияет на беременность. Однако, если вы планируете в будущем беременности, то надо иметь в виду, что результат операции может не сохраниться.

Информация для пациентов женского пола

Важно сообщить своему пластическому хирургу, если вы принимаете противозачаточные таблетки, заместительную эстрогеновую терапию или подозреваете, что можете быть беременны.

Интимные отношения после операции

Хирургическое вмешательство предполагает коагуляцию кровеносных сосудов, и любое повышение активности может привести к открытию этих сосудов, что приведет к кровотечению или гематоме. Целесообразно воздерживаться от интимной физической активности до тех пор, пока ваш врач не подтвердит, что это безопасно.

Расстройства психического здоровья и плановая хирургия

Важно, чтобы все пациенты, желающие пройти плановую операцию, имели реалистичные ожидания, направленные на улучшение, а не на совершенство. Осложнения или неудовлетворительные результаты иногда неизбежны, могут потребовать дополнительной операции и часто вызывают стресс. Пожалуйста, открыто обсудите со своим хирургом перед операцией любые случаи серьезной эмоциональной депрессии или психических расстройств, которые у вас были в анамнезе. Хотя многие люди могут получить психологическую пользу от результатов плановой операции, влияние на психическое здоровье невозможно точно предсказать.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Существует множество различных состояний, которые могут повлиять на долгосрочный результат операции. Последующие изменения внешнего вида вашего тела могут иметь место в результате старения, пребывания на солнце, потери или увеличения веса, беременности, менопаузы или других обстоятельств, не связанных с операцией.

Повторная операция

Неизвестно, как отреагирует ваша ткань или как будет происходить заживление ран после операции. Вторичная операция может потребоваться для дополнительной коррекции оставшихся подкожно-жировых отложений. В случае возникновения

Пациент: _____



осложнений может потребоваться дополнительная операция или другие методы лечения. Несмотря на то, что риски и осложнения возникают нечасто, они возможны. Хирургия не является точной наукой. Несмотря на то, что ожидаются хорошие результаты, нет никаких явных или подразумеваемых гарантий относительно результатов, которые могут быть получены. В некоторых ситуациях невозможно достичь оптимальных результатов за одну хирургическую операцию. При необходимости выполнения дополнительных хирургических вмешательств возникнут дополнительные затраты, включая расходы на хирургическое вмешательство, анестезию, стационарное пребывание и лабораторные исследования.

Неудовлетворительный результат

Несмотря на то что обычно операция предполагает хорошие результаты, не существует никаких гарантий относительно результатов операции. Тело не симметрично, почти во всех случаях есть некоторая степень асимметрии, которую невозможно распознать заранее. Левая и правая стороны лица отличаются друг от друга. То же самое касается молочных желез и локальных жировых отложений. Многие из таких проблем не могут быть полностью устранены хирургическим путем. Чем более реалистичны ваши ожидания относительно результатов, тем лучше они покажутся вам. Некоторые пациенты никогда не достигают желаемых целей или результатов не по вине хирурга или операции. Вы можете быть разочарованы результатами операции. После операции могут возникнуть асимметрия, непредвиденная форма и размер, потеря функции, расхождение швов раны, плохое заживление и потеря чувствительности. Размер может быть неправильным. Может возникнуть неудовлетворительное расположение или внешний вид хирургического рубца. Для улучшения результатов может потребоваться дополнительная операция. Неудовлетворительные результаты могут НЕ улучшаться после дополнительного лечения, которое потребует дополнительных финансовых затрат.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Тщательно следуйте всем указаниям врача; это важно для успеха Вашей операции. Важно, чтобы хирургические разрезы не подвергались чрезмерным воздействиям во время заживления. Активность и профессиональная деятельность должны быть ограничены. Защитные повязки и дренажи не следует снимать без указаний пластического хирурга. Успешное послеоперационное восстановление зависит как от операции, так и от последующего ухода. Физическая активность, которая увеличивает частоту сердечных сокращений, может привести к подъему артериального давления, что в свою очередь может вызвать дополнительные кровоизлияния, усилить отеки, вызвать скопление жидкости и необходимость проведения дополнительных манипуляций или операции. Важно, чтобы Вы всецело способствовали своему выздоровлению после операции.

Курение, пассивное курение, никотиновые продукты (пластырь, жевательная резинка, назальный спрей)

Пациент: _____



Пациенты, которые в настоящее время курят или употребляют табачные или никотиновые продукты (пластыри, жевательные резинки или назальный спрей), подвергаются большому риску серьезных хирургических осложнений, таких как замедленное заживление и образование видимых рубцов. Лица, подвергающиеся пассивному курению, также подвергаются потенциальному риску подобных осложнений, связанных с воздействием никотина. Кроме того, курение может оказать существенное негативное влияние на анестезию и восстановление после нее, вызывая кашель и, возможно, усиление кровотечения. Лица, не подвергающиеся воздействию табачного дыма или никотинсодержащих продуктов, имеют значительно меньший риск возникновения осложнений такого типа. Пожалуйста, укажите ваш текущий статус по пунктам ниже:

___ Я не курю и не употребляю никотиновые продукты. Я понимаю потенциальный риск воздействия вторичного табачного дыма, вызывающего хирургические осложнения.

___ Я курю или употребляю табачные/никотиновые изделия. Я понимаю риск хирургических осложнений из-за курения или употребления никотиновых продуктов.

___ Я курил и бросил примерно _____ назад. Я понимаю, что в моем организме все еще могут наблюдаться последствия и, следовательно, риски от курения, если не прошло достаточно времени.

___ Мне посоветовали немедленно бросить курить и проинформировали о рисках, преимуществах, ожиданиях и альтернативах операции, если я продолжу курить.

Важно воздерживаться от курения по крайней мере за 6 недель до операции и до тех пор, пока ваш врач не подтвердит, что при желании можно вернуться к курению.

_____ Я подтверждаю, что сообщу своему врачу, если продолжу курить в течение этого периода, и понимаю, что в целях моей безопасности операция, если это возможно, может быть отложена.

Апноэ во сне

Пациентам с нарушениями дыхания (обструктивное апноэ во сне), а также пациентам, использующим дополнительную кислородную поддержку в ночное время, необходимо знать, что они подвергаются существенному риску остановки дыхания и смерти в результате приема наркотических обезболивающих препаратов после операции. Хирургическое вмешательство может рассматриваться только при условии последующего стационарного наблюдения, чтобы снизить риск потенциальных респираторных осложнений и безопасно контролировать боль после операции.

Обратите внимание на следующие симптомы апноэ во сне:

___ Я часто устаю после пробуждения и в течение дня

Пациент: _____



___ Мне трудно заснуть по ночам

___ Мне сказали, что я храплю или перестаю дышать во время сна

___ Я просыпаюсь ночью или постоянно поворачиваюсь из стороны в сторону

___ Мне сказали, что мои ноги или руки дергаются, пока я сплю

___ Во время сна я издаю резкие фыркающие звуки

___ Я чувствую усталость или засыпаю в течение дня

Очень важно сообщить и обсудить любые из вышеперечисленных симптомов со своим хирургом.

Риски тромбоза глубоких вен (ТГВ), легочной эмболии (ЛЭ) и рекомендации

При каждой хирургической процедуре существует риск образования тромбов, тромбоза глубоких вен (ТГВ) и легочной эмболии (ЛЭ). Это зависит от факторов риска, указанных ниже. Вы можете использовать специальное компрессионное белье, активные сжимающие устройства для ног и, возможно, лекарства, которые помогут снизить риск.

Существует множество состояний, которые могут увеличить или повлиять на риск образования тромбов. Сообщите своему врачу о любых случаях из нижеперечисленного:

- Личный анамнез тромбов
- Семейный анамнез тромбов
- Противозачаточные таблетки
- Гормоностимулирующие препараты
- Отек ног
- Онкологические заболевания в анамнезе
- Прием больших доз витаминов
- Варикозное расширение вен
- Перенесенные заболевания сердца, печени, легких или желудочно-кишечного тракта

Пациент: _____



- Множественные самопроизвольные аборты или выкидыши в анамнезе

Я понимаю риски, связанные с ТГВ/ЛЭ, и важность соблюдения предписаний моего хирурга. К методам профилактической терапии относятся:

- Ранняя активация
- Компрессионные устройства
- Антикоагулянтная терапия

Если ваша операция выполняется не по жизненным показаниям, и вы относитесь к группе высокого риска, лучше всего отказаться от такой плановой операции.

СПОСОБЫ КОММУНИКАЦИИ

Есть много способов связаться с вами. Важно приходить на прием и сообщать нам, если возникают проблемы. Способы связи: телефон, мессенджеры, электронная и обычная почта. Если возникнет чрезвычайная ситуация, держите нас в курсе вашего состояния, чтобы мы могли помочь в любом необходимом лечении.

Пожалуйста, подтвердите способы взаимодействия с Вами:

- _____ Телефон (мобильный)
- _____ Телефон (стационарный)
- _____ Телефон (рабочий)
- _____ WhatsApp
- _____ Telegram
- _____ Электронная почта: _____

Пациент: _____



ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ

1. Настоящим я разрешаю доктору _____ провести мне операцию **липосакцию** и любым его/ее ассистентам участвовать в операции и послеоперационном ведении.

Я получил(-а) исчерпывающую информацию по операции: **липосакция**.

2. Я осознаю, что во время операции, медицинского лечения или анестезии непредвиденные обстоятельства могут потребовать выполнения процедур, отличающихся от описанных выше. В связи с вышеизложенным, я уполномочиваю вышеуказанного врача и его помощников или уполномоченных лиц выполнять любые иные процедуры, которые, исходя из его или ее профессионального суждения, являются необходимыми и желательными. Полномочия, предоставленные в соответствии с настоящим параграфом, включают все состояния, требующие лечения и не известные моему врачу на момент начала процедуры.

3. Я понимаю, что нет никаких подразумеваемых или конкретных гарантий относительно результата операции. У меня была возможность объяснить свои цели и понять, какие желаемые результаты реалистичны, а какие нет. На все мои вопросы были даны исчерпывающие ответы, и я понимаю присущие моей операции риски, а также дополнительные риски, осложнения и альтернативы. Понимая все это, я принимаю решение о выполнении операции.

4. Я даю согласие на то, чтобы соответствующие части моего тела фотографировали до, во время и после операции в медицинских, научных или образовательных целях при условии, что моя личность не может быть установлена по изображениям.

5. В целях повышения уровня медицинского образования я даю согласие на допуск наблюдателей в операционную.

6. Я даю согласие на применение таких анестетиков, которые считаются необходимыми или целесообразными. Я понимаю, что все формы анестезии сопряжены с риском и возможностью осложнений.

7. Я даю согласие на утилизацию любых тканей, медицинских устройств или частей тела, которые могут быть удалены в ходе операции.

8. Я осознаю, что существуют потенциальные значительные риски для моего здоровья при использовании продуктов крови и я даю согласие на их использование, если мой хирург либо его/ее ассистенты сочтут это необходимым.

Пациент: _____



9. Я осведомлен(-а) о стоимости медицинских услуг, связанных с операцией, и эта стоимость меня устраивает.

10. Я понимаю, что могу отказаться от операции.

Я ознакомлен(-а) с особенностями предстоящей операции, планом хирургического лечения, расположением рубцов, особенностями восстановительного периода, возможными осложнениями и рисками, альтернативными методами лечения, полностью осознаю содержание и назначение данного документа, даю свое согласие на операцию и обязуюсь выполнять все рекомендации врача.

Дата: _____

ФИО пациента: _____

Подпись пациента: _____

Пациент: _____