



ИНСТИТУТ

пластической хирургии
и косметологии

Информированное добровольное согласие

Эстетическая блефаропластика



Этот документ призван помочь проинформировать Вас об операции по устранению избытков кожи верхних и нижних век (эстетическая блефаропластика), ее рисках, а также об альтернативных методах лечения.

Важно, чтобы Вы прочитали эту информацию внимательно и полностью. Пожалуйста, поставьте подпись на каждой странице, указав, что вы прочитали ее и подписали согласие на операцию, предложенную Вашим пластическим хирургом и согласованную с Вами.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕЙ ОПЕРАЦИИ

Эстетическая блефаропластика (ЭБ) — это хирургическая операция, направленная на устранение избытков кожи верхних и нижних век, с участком круговой мышцы глаза или без него и жировых грыж в медиальном и срединном отделах верхних век, медиальном, срединном и латеральном отделах нижних век. Выполнение этих этапов операции, как правило, позволяет получить удовлетворительный эстетический результат. ЭБ

Пациент: _____



Информированное согласие – эстетическая блефаропластика

выполняется либо через кожные разрезы по ходу естественной складки в области верхнего века и под ресничным краем в области нижнего века, продолжающиеся за наружный угол до 1,5 см., либо через конъюнктиву (траснконъюнктивально). Трансконъюнктивальный доступ выполняется при нижней ЭБ. Нижняя ЭБ может быть дополнена (при наличии показаний) миопексией (поднятие и фиксация круговой мышцы глаза нижнего века в более высоком положении) или кантопексией (поднятие и фиксация сухожилия (крепления)) в наружном углу глаза.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ

Эстетическая блефаропластика – плановая хирургическая операция. Альтернативное лечение может заключаться в отказе от хирургической процедуры или использовании специальных наклеек на веки.

РИСКИ ОПЕРАЦИИ

Каждая хирургическая операция сопряжена с определенным риском, и важно, чтобы Вы понимали эти риски и возможные осложнения, связанные с ними. Кроме того, каждая процедура имеет ограничения. Выбор пациента пройти хирургическое вмешательство основан на сопоставлении возможных рисков с потенциальной пользой. Хотя у большинства пациентов эти осложнения не возникают, вам следует обсудить каждое из них со своим пластическим хирургом, чтобы убедиться, что вы понимаете все возможные последствия операции.

Пациент: _____



СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РИСКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ БЛЕФАРОПЛАСТИКИ

Поверхностная гематома

Осложнение, возникающее вследствие кровотечения в поверхностных слоях верхнего или нижнего века. Как правило, локализуется между кожей и круговой мышцей глаза. Лечение поверхностной гематомы сводится к применению лекарственных препаратов, усиливающих свертываемость крови, а также в воздействии холода на данную область.

Слезоточивость

Этот симптом возникает достаточно часто, особенно после нижней блефаропластики. Как правило, носит достаточно непродолжительный характер и проходит самостоятельно, однако в редких случаях может продолжаться несколько месяцев (в этом случае Вам будет необходимо наблюдение и лечение у офтальмолога).

Отек конъюнктивы глазного яблока (хемоз)

Возникает после нижней или круговой блефаропластики. Ваш врач назначит лечение и, при необходимости, направит к офтальмологу. Это состояние проходит в среднем в течение 4-7 дней при условии соблюдения рекомендаций врача.

Изменение качества зрения

После операции у Вас может измениться качество зрения, что будет проявляться в виде удвоенного изображения одного объекта (диплопии). Она бывает временной и постоянной. Временная диплопия проходит через 2-6 часов и не требует специального лечения, является реакцией зрительного аппарата на операционную травму. Постоянная диплопия является

Пациент: _____



Информированное согласие – эстетическая блефаропластика

результатом повреждения нижней косой мышцы глаза и требует дополнительной хирургической коррекции.

Конъюнктивит

Это осложнение может развиваться после эстетической блефаропластики в результате местного воздействия лекарственных препаратов на фоне сниженного иммунитета, несоблюдения правил ухода за веками, использования искусственных ресниц и вследствие наличия аллергических реакций в анамнезе. У вас могут быть ощущения инородного тела в глазу, слезотечение, умеренный зуд, отделяемое из конъюнктивальной борозды, склеивание ресниц по утрам. Данное состояние хорошо поддается лекарственной терапии. При возникновении подобных ощущений обязательно проинформируйте своего врача.

Контактный дерматит кожи век

Может развиваться как аллергическая реакция на медицинские наклейки (стрипы), лекарственные препараты, антисептические растворы. В зависимости от выраженности аллергической реакции, в лечении используются как местные препараты, так и лекарственные препараты общего действия. Важно сообщить своему врачу о появлении таких симптомов, как покраснение, зуд, отек и кожные высыпания.

Лагофтальм

Патологическое состояние, клинически проявляющееся неполным смыканием век вследствие нарушения иннервации круговой мышцы глаза. Носит временный или постоянный характер. Данное осложнение чаще всего является следствием послеоперационного отека. При постоянном лагофтальме потребуются дополнительное хирургическое лечение.

Птоз верхнего века (блефароптоз)

Пациент: _____



Информированное согласие – эстетическая блефаропластика

Аномальное расположение верхнего века, при котором глазная щель оказывается частично или полностью закрыта. Выражается в невозможности полностью поднять верхнее веко, часто является следствием некорректно диагностированного предоперационного птоза. Это состояние требует дополнительного консервативного лечения и купируется в течение 2-5 недель. В редких случаях возможно повреждение мышцы, поднимающей верхнее веко (леватора), что потребует дополнительной хирургической коррекции.

Эктропион (выворот слизистой оболочки века наружу)

Патология, при которой веко перестаёт плотно прилегать к главному яблоку и отходит от него, обнажая слизистую оболочку глаза (конъюнктиву). Одно из возможных осложнений нижней блефаропластики. Может носить временный характер, возникает за счёт послеоперационного отека и не требует дополнительного лечения, проходит в течение 7 дней. В некоторых случаях может потребоваться дополнительное хирургическое лечение.

Изменение формы глазной щели

Это осложнение развивается, как правило, после нижней блефаропластики и характеризуется изменением формы глаза от миндалевидной к более круглой – «круглый глаз» или «склеральный вид». Для восстановления обычной формы глазной щели необходима повторная хирургическая операция.

Кератоконъюнктивит

Заболевание, характеризующееся воспалением роговицы и конъюнктивы глаза. Может возникнуть вследствие как инфекции, так и воздействия ряда неблагоприятных физических факторов, аллергенов, при повреждении слизистой оболочки глаза.

Пациент: _____



Информированное согласие – эстетическая блефаропластика

Часто патологический процесс возникает остро, сопровождается выраженной резью, слезотечением, светобоязнью, ощущением «соринки» под веком, снижением зрения. Эта патология не является прямым следствием блефаропластики, но может возникнуть при наличии какой-либо иной патологии конъюнктивы. Если у Вас были в прошлом какие-либо заболевания глаз, перед операцией необходимо получить консультацию офтальмолога для принятия профилактических мер. Лечение кератоконъюнктивита преимущественно местное, включает применение различных капель и мазей.

Недостаточное удаление жировых грыж

Не является прямым осложнением блефаропластики, возникает вследствие анатомических особенностей глаза и технических аспектов блефаропластики (использование анестезирующего раствора, который может исказить истинный объем жировой клетчатки).

Ретробульбарная гематома

Серьезное осложнение, возникающее после нижней блефаропластики, которое при несвоевременно оказанной специализированной медицинской помощи может привести к частичной или полной потере зрения. Очень важно находиться под медицинским наблюдением после круговой и нижней блефаропластики – при ретробульбарной гематоме временной фактор имеет определяющее значение.

Прочие осложнения

Мелкие кисты по линии рубца.

Пациент: _____



Информированное согласие – эстетическая блефаропластика

Расхождение краев раны при травматизации (очень важно следовать рекомендациям врача по уходу после операции, учитывать особенности мытья головы и иные меры предосторожности).

Сохранение анатомической асимметрии глазных щелей, складок век.

ОБЩИЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ РИСКИ

Определенные заболевания, употребление биологически активных добавок и лекарственных препаратов могут задерживать выздоровление и препятствовать ему. Необходимо сообщить своему хирургу об этом, и он примет решение о продолжении приема этих препаратов или о временной приостановке их приема. У пациентов с существенной потерей веса может наблюдаться задержка заживления, что может привести к расхождению краев раны, инфекции и изменениям тканей, что, в свою очередь, приводит к необходимости дополнительной медицинской помощи, хирургического вмешательства и длительной госпитализации. Курение приводит к задержке процесса заживления, что может приводить к необходимости дополнительной операции. Существуют также общие осложнения, связанные с длительным заживлением, такие как отек, кровотечение, возможность дополнительной операции, длительное восстановление, изменение цвета кожи, изменения формы, инфекция, несоответствие целям и ожиданиям пациента, а также дополнительные расходы для пациента. У пациентов со значительным снижением эластичности кожи после операции качество кожи не изменится, поэтому через некоторое время в будущем может произойдет рецидив данного состояния, причем у некоторых пациентов это может происходить быстрее. Существуют поверхностные чувствительные нервные окончания, которые повреждаются при проведении хирургических разрезов, и в дальнейшем могут быть вовлечены в процесс формирования рубца. Это в дальнейшем может привести к формированию болезненной или сверхчувствительной области в послеоперационной зоне. Происходит это вследствие попадания участка чувствительного нерва в формирующуюся

Пациент: _____



Информированное согласие – эстетическая блефаропластика

рубцовую ткань. Как правило, с течением времени данный симптом проходит самостоятельно, но в некоторых случаях может потребоваться дополнительное лечение (массаж, физиотерапия, прием лекарственных препаратов). Такое лечение может потребовать дополнительных финансовых затрат. Важно обсудить послеоперационные боли с Вашим хирургом.

Кровотечение

Возможно возникновение кровотечения во время или после операции. В случае возникновения послеоперационного кровотечения может потребоваться дополнительная хирургическая операция с целью выявления источника кровотечения и его коагуляции. В некоторых случаях достаточно дренирования скопившейся крови. В зависимости от объема гематомы врач может назначить переливание крови, хотя такие случаи редки. Скопление крови, которое может образоваться под кожей после операции, называется гематомой. Повышенная физическая активность вскоре после операции может привести к увеличению вероятности кровотечения и необходимости проведения дополнительной операции. Важно следовать послеоперационным инструкциям и ограничить физические нагрузки и напряженную деятельность в течение указанного времени. В зависимости от вида хирургической операции Ваш хирург может назначить лекарства после операции для предотвращения образования тромбов. Эти лекарства влияют на свертываемость крови и могут вызвать повышенную кровоточивость в области операции. Изменения свертываемости крови проходят после отмены этих препаратов.

Инфекционные осложнения

Инфекционное воспаление, хотя и нечасто, может возникнуть после операции. К воспалительным (инфекционным) осложнениям относятся флегмона и абсцесс. В случае возникновения инфекции может потребоваться дополнительное лечение, включая антибиотикотерапию, госпитализацию и

Пациент: _____



Информированное согласие – эстетическая блефаропластика

дополнительную операцию. Данное лечение может потребовать дополнительных финансовых затрат. Важно сообщить своему хирургу о любых других инфекциях в анамнезе, таких как инфекции верхних дыхательных путей/пневмонии, фурункулы, вросший ноготь на ноге, укус насекомого, воспаление зуба, герпес или инфекция мочевыводящих путей. Инфекции других частей тела могут привести к инфицированию послеоперационной области. Воспалительные осложнения часто приводят к образованию более обширных рубцов и предполагают повторное хирургическое вмешательство.

Рубцевание

Некоторые пациенты склонны к образованию «гипертрофических» или «келоидных» рубцов, то есть заметных, приподнятых, красных рубцов, которые вызывают эстетический и физический дискомфорт. В этих случаях может потребоваться дальнейшее лечение с помощью лекарств и/или хирургического вмешательства. Данное лечение может потребовать дополнительных финансовых затрат.

Чувствительность кожи

После операции могут возникнуть зуд, болезненность или чрезмерная реакция на высокие или низкие температуры в послеоперационной области. Обычно это проходит во время заживления, но в редких случаях симптомы могут стать хроническими.

Расхождение послеоперационных швов

Пациент: _____



Информированное согласие – эстетическая блефаропластика

Швы могут разойтись после операции. В этом случае может потребоваться дополнительное лечение, включая хирургическое вмешательство.

Швы

В большинстве хирургических методик для закрытия операционной раны используются глубокие швы. Они позволяют правильно восстановить подкожные и кожные слои. Иногда швы могут спонтанно выйти на поверхность кожи, стать видимыми или вызвать раздражение, требующее удаление этих швов.

Лигатурный свищ

Лигатурный свищ – это одно из поздних гнойно-воспалительных послеоперационных осложнений, связанное с отторжением инородного тела (хирургической нити, хирургического узла). Лигатурный свищ может возникнуть в период от нескольких дней до нескольких лет после операции. В области послеоперационного рубца возникает покраснение, умеренные боли, может повышаться температура тела. Эти явления связаны с нагноением и появлением скопления гноя под кожей – лигатурного абсцесса. Через несколько дней абсцесс самопроизвольно прорывается на коже в области рубца, вытекает содержимое, и на коже остается небольшое отверстие с подтеканием мутноватой жидкости. Для лечения лигатурного свища необходимо дополнительное лечение, включая хирургическое вмешательство.

Повреждение более глубоких частей тела

Во время любой хирургической операции существует вероятность повреждения более глубоких структур, включая нервы, кровеносные сосуды, лимфатические сосуды, мышцы, легкие (пневмоторакс), органы брюшной полости. Вероятность этого зависит от типа выполняемой операции.

Пациент: _____



Анестезия

Как местная, так и общая анестезия сопряжены с риском. Существует вероятность осложнений, травм, развития аллергической реакции, что может потребовать проведения экстренных мероприятий.

Сердечные и легочные осложнения

Легочные осложнения могут возникать вторично из-за тромбов (легочная эмболия), жировых отложений (жировая эмболия), пневмонии или частичного коллапса легких после общей анестезии. Легочная эмболия в некоторых случаях может быть опасной для жизни или фатальной. Важно информировать вашего доктора о прошлых отеках ног и о выявленных тромбозах в прошлом. Сердечные осложнения представляют собой риск при любом хирургическом вмешательстве и анестезии, даже у пациентов без симптомов. Если вы когда-то испытывали одышку, боли в груди или необычное сердцебиение, сообщите об этом вашему доктору. В случае возникновения любого из этих осложнений вам может потребоваться госпитализация и дополнительное лечение.

Венозный тромбоз

Некоторые таблетки с высоким содержанием эстрогена могут увеличить риск тромбоза вен. Важно обсудить со своим хирургом прием противозачаточных лекарств, которые вы используете. Наличие в анамнезе кровотечений и проблем со свертываемостью крови также может увеличить риск тромбоза вен.

Аллергические реакции

В редких случаях сообщалось о местной аллергии на хирургические наклейки, шовный материал, антисептики, препараты крови, препараты местного применения. Серьезные системные реакции, включая шок (анафилаксию), могут возникнуть в ответ на лекарства, используемые во

Пациент: _____



Информированное согласие – эстетическая блефаропластика

время операции, и назначенные препараты. Аллергические реакции могут потребовать дополнительного лечения. Важно сообщить своему врачу о любых предыдущих аллергических реакциях.

Реакции на лекарства

Возможны неожиданная лекарственная аллергия или отсутствие эффективности при назначении лекарственного препарата. Поэтому в некоторых случаях необходимую терапию определяют подбором препарата, оценивая его эффективность. Вам важно сообщить своему врачу о любых проблемах, которые у вас возникли с какими-либо лекарствами или аллергией на лекарства, прописанные или безрецептурные, а также о лекарствах, которые вы сейчас регулярно принимаете. Предоставьте своему хирургу список лекарств и добавок, которые вы в настоящее время принимаете.

Жировая/воздушная эмболия

В редких случаях частицы жира или воздух могут попасть в сосудистую систему, в сердце, легкие или мозг. Это может привести к серьезным осложнениям, включая смерть.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Последующие изменения внешнего вида вашего лица могут иметь место в результате старения, пребывания на солнце, потери или увеличения веса, беременности, менопаузы или других обстоятельств, не связанных с операцией.

Неудовлетворительный результат

Несмотря на то, что обычно операция предполагает хорошие результаты, не существует никаких гарантий в отношении итога операции. Тело и лицо не симметричны, и почти во всех случаях есть некоторая степень асимметрии,

Пациент: _____



Информированное согласие – эстетическая блефаропластика

которую невозможно распознать заранее. Одна сторона лица может быть немного больше, другая – более опущенной. Многие из таких проблем не могут быть полностью устранены хирургическим путем. Чем более реалистичны ваши ожидания относительно результатов, тем лучше они покажутся вам. Некоторые пациенты никогда не достигают желаемых целей или результатов не по вине хирурга или операции. Вы можете быть разочарованы результатами операции. После операции могут возникнуть асимметрия, непредвиденная форма, потеря функции, расхождение швов раны, плохое заживление. Может возникнуть неудовлетворительное расположение или внешний вид хирургического рубца. Для улучшения результатов может потребоваться дополнительная операция. Неудовлетворительные результаты могут НЕ улучшаться после дополнительного лечения.

Повторная операция

Существует множество различных состояний, которые могут повлиять на долгосрочный результат операции. Неизвестно, как отреагирует ваша ткань или как будет происходить заживление ран после операции. В случае возникновения осложнений может потребоваться дополнительная операция или другие методы лечения. Несмотря на то, что риски и осложнения возникают нечасто, они возможны. Хирургия не является точной наукой. Несмотря на то, что ожидаются хорошие результаты, нет никаких явных или подразумеваемых гарантий в отношении результатов, которые могут быть получены. В некоторых ситуациях невозможно достичь оптимальных результатов за одну хирургическую процедуру. Вы и ваш хирург обсудите доступные варианты, если будет рекомендована дополнительная операция. Могут возникнуть дополнительные затраты на такие дополнительные процедуры, включая расходы на хирургическое вмешательство, анестезию и лабораторные исследования.

Пациент: _____



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Воздействие солнца (прямое либо солярий)

Воздействие солнца на участки операции может привести к увеличению рубцов, изменению цвета и плохому заживлению. Пациенты, которые загорают на открытом воздухе или в солярии, должны сообщить об этом своему хирургу и либо отложить лечение, либо избегать загара до тех пор, пока хирург не скажет, что возобновление загара безопасно. Повреждающее воздействие солнечных лучей проявляется даже при использовании солнцезащитного крема или защитной одежды.

Путешествия

Любая операция сопряжена с риском осложнений, которые могут замедлить выздоровление и возвращение к нормальной жизни. Пожалуйста, сообщите хирургу о любых планах поездок, чтобы можно было выбрать подходящее время для операции. Нет никаких гарантий, что вы сможете возобновить все виды деятельности в желаемые сроки. Если вам необходимо в ближайшее время после операции совершить авиаперелет обговорите это со своим хирургом. Он даст вам нужные рекомендации.

Пирсинг

Людам, которые в настоящее время носят украшения для пирсинга в области хирургического вмешательства, следует сообщить, что в результате этого может развиваться инфекция. Украшения для пирсинга следует снять перед хирургической процедурой.

Ногти

Чтобы определить ваше жизненно важное состояние во время операции, вашему анестезиологу может потребоваться доступ к вашим ногтям для

Пациент: _____



Информированное согласие – эстетическая блефаропластика

наблюдения. В день операции убедитесь, что по крайней мере на двух ногтях пальцев нет лака или акрила.

Ювелирные изделия

Ювелирные изделия не следует брать с собой во время хирургической процедуры. Такие предметы, как серьги, обручальные кольца, ожерелья и т. д. следует снять и положить в безопасное место. Не берите с собой на операцию украшения.

Будущая беременность

Известно, что эта операция не влияет на беременность.

Информация для пациентов женского пола

Важно сообщить своему пластическому хирургу, если вы принимаете противозачаточные таблетки, заместительную эстрогеновую терапию или подозреваете, что можете быть беременны.

Интимные отношения после операции

Хирургическое вмешательство предполагает коагуляцию кровеносных сосудов, и любое повышение активности может привести к открытию этих сосудов, что приведет к кровотечению или гематоме. Целесообразно воздерживаться от интимной физической активности до тех пор, пока ваш врач не подтвердит, что это безопасно.

Расстройства психического здоровья и плановая хирургия

Важно, чтобы все пациенты, желающие пройти плановую операцию, имели реалистичные ожидания, направленные на улучшение, а не на совершенство. Осложнения или неудовлетворительные результаты иногда неизбежны, могут потребовать дополнительной операции и часто вызывают стресс. Пожалуйста, открыто обсудите со своим хирургом перед операцией любые

Пациент: _____



Информированное согласие – эстетическая блефаропластика

случаи серьезной эмоциональной депрессии или психических расстройств, которые у вас были в анамнезе. Хотя многие люди могут получить психологическую пользу от результатов плановой операции, влияние на психическое здоровье невозможно точно предсказать.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Тщательно следуйте всем указаниям врача; это важно для успеха Вашей операции. Важно, чтобы хирургические разрезы не подвергались чрезмерным воздействиям во время заживления. Активность и профессиональная деятельность должны быть ограничены. Защитные повязки и дренажи не следует снимать без указаний пластического хирурга. Успешное послеоперационное восстановление зависит как от операции, так и от последующего ухода. Физическая активность, которая увеличивает частоту сердечных сокращений, может привести к подъему артериального давления, что в свою очередь может вызвать дополнительные кровоизлияния, усилить отеки, вызвать скопление жидкости и необходимость проведения дополнительной операции. Важно, чтобы Вы всецело способствовали своему выздоровлению после операции.

Курение, пассивное курение, никотиновые продукты (пластырь, жевательная резинка, назальный спрей)

Пациенты, которые в настоящее время курят или употребляют табачные или никотиновые продукты (пластыри, жевательные резинки или назальный спрей), подвергаются большому риску серьезных хирургических осложнений, таких как замедленное заживление и образование видимых рубцов. Лица, подвергающиеся пассивному курению, также подвергаются потенциальному риску подобных осложнений, связанных с воздействием никотина. Кроме того, курение может оказать существенное негативное влияние на анестезию и восстановление после нее, вызывая кашель и, возможно, усиление кровотечения. Лица, не подвергающиеся воздействию табачного дыма или

Пациент: _____



Информированное согласие – эстетическая блефаропластика

никотинсодержащих продуктов, имеют значительно меньший риск возникновения осложнений такого типа. Пожалуйста, укажите ваш текущий статус по пунктам ниже:

___ Я не курю и не употребляю никотиновые продукты. Я понимаю потенциальный риск воздействия вторичного табачного дыма, вызывающего хирургические осложнения.

___ Я курю или употребляю табачные/никотиновые изделия. Я понимаю риск хирургических осложнений из-за курения или употребления никотиновых продуктов.

___ Я курил и бросил примерно _____ назад. Я понимаю, что в моем организме все еще могут наблюдаться последствия и, следовательно, риски от курения, если не прошло достаточно времени.

___ Мне посоветовали немедленно бросить курить и проинформировали о рисках, преимуществах, ожиданиях и альтернативах операции, если я продолжу курить.

Важно воздерживаться от курения по крайней мере за 6 недель до операции и до тех пор, пока ваш врач не подтвердит, что при желании можно вернуться к курению.

_____ Я подтверждаю, что сообщу своему врачу, если продолжу курить в течение этого периода времени, и понимаю, что в целях моей безопасности операция, если это возможно, может быть отложена.

Пациент: _____



Апноэ во сне

Пациентам с нарушениями дыхания (обструктивное апноэ во сне), а также пациентам, использующим дополнительную кислородную поддержку в ночное время, необходимо знать, что они подвергаются существенному риску остановки дыхания и смерти в результате приема наркотических обезболивающих препаратов после операции. Хирургическое вмешательство может рассматриваться только при условии последующего стационарного наблюдения, чтобы снизить риск потенциальных респираторных осложнений и безопасно контролировать боль после операции.

Обратите внимание на следующие симптомы апноэ во сне:

___ Я часто устаю после пробуждения и в течение дня

___ Мне трудно заснуть по ночам

___ Мне сказали, что я храплю или перестаю дышать во время сна

___ Я просыпаюсь ночью или постоянно поворачиваюсь из стороны в сторону

___ Мне сказали, что мои ноги или руки дергаются, пока я сплю

___ Во время сна я издаю резкие фыркающие звуки

___ Я чувствую усталость или засыпаю в течение дня

Очень важно сообщить и обсудить любые из вышеперечисленных симптомов со своим хирургом.

Пациент: _____



Информированное согласие – эстетическая блефаропластика

Риски тромбоза глубоких вен (ТГВ), легочной эмболии (ЛЭ) и рекомендации

При каждой хирургической процедуре существует риск образования тромбов, тромбоза глубоких вен (ТГВ) и легочной эмболии (ЛЭ). Это зависит от факторов риска, указанных ниже. Перед и во время операции будут применяться средства профилактики этих осложнений в соответствии с установленными клиническими рекомендациями, которые помогут снизить этот риск.

Существует множество состояний, которые могут увеличить или повлиять на риск образования тромбов. Сообщите своему врачу о любых случаях из нижеперечисленного:

- Личный анамнез тромбов
- Семейный анамнез тромбов
- Противозачаточные таблетки
- Гормоностимулирующие препараты
- Отек ног
- Онкологические заболевания в анамнезе
- Прием больших доз витаминов
- Варикозное расширение вен
- Перенесенные заболевания сердца, печени, легких или желудочно-кишечного тракта

Пациент: _____



- Множественные самопроизвольные аборты или выкидыши в анамнезе

Я понимаю риски, связанные с ТГВ/ЛЭ, и важность соблюдения предписаний моего хирурга. К методам профилактической терапии относятся:

- Ранняя активация
- Компрессионные устройства
- Антикоагулянтная терапия

Если ваша операция является плановой, и вы относитесь к группе высокого риска, лучше всего отказаться от такой плановой операции.

СПОСОБЫ КОММУНИКАЦИИ

Есть много способов связаться с вами. Важно приходить на прием и сообщать нам, если возникают проблемы. Способы связи: телефон, мессенджеры, электронная и обычная почта. Если возникнет чрезвычайная ситуация, держите нас в курсе вашего состояния, чтобы мы могли помочь в любом необходимом лечении.

Пожалуйста, подтвердите способы взаимодействия с Вами:

- ___ Телефон (мобильный)
- ___ Телефон (стационарный)
- ___ Телефон (рабочий)
- ___ WhatsApp
- ___ Telegram
- ___ Viber
- ___ Электронная почта: _____

Пациент: _____



ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ

1. Настоящим я разрешаю доктору _____ провести мне операцию **эстетическую блефаропластику** и любым его/ее ассистентам участвовать в операции и послеоперационном ведение.

Я получил(-а) исчерпывающую информацию по операции: **устранения избытков кожи верхних и нижних век (эстетическая блефаропластика)**

2. Я осознаю, что во время операции, медицинского лечения или анестезии непредвиденные обстоятельства могут потребовать выполнения процедур, отличающихся от описанных выше. В связи с указанным, я уполномочиваю вышеуказанного врача и его помощников или уполномоченных лиц выполнять любые иные процедуры, которые, исходя из его или ее профессионального суждения, являются необходимыми и желательными. Полномочия, предоставленные в соответствии с настоящим параграфом, включают все состояния, требующие лечения и не известные моему врачу на момент начала процедуры.

3. Я даю согласие на применение таких анестетиков, которые считаются необходимыми или целесообразными. Я понимаю, что все формы анестезии сопряжены с риском и возможностью осложнений.

Пациент: _____



Информированное согласие – эстетическая блефаропластика

4. Я понимаю, что нет никаких подразумеваемых или конкретных гарантий относительно результата операции. У меня была возможность объяснить свои цели и понять, какие желаемые результаты реалистичны, а какие нет. На все мои вопросы были даны исчерпывающие ответы, и я понимаю присущие моей операции риски, а также дополнительные риски, осложнения и альтернативы. Понимая все это, я принимаю решение о выполнении операции.

5. Я даю согласие на то, чтобы соответствующие части моего тела фотографировали до, во время и после операции, в медицинских, научных или образовательных целях при условии, что моя личность не может быть установлена по изображениям.

6. В целях повышения уровня медицинского образования я даю согласие на допуск наблюдателей в операционную.

7. Я даю согласие на утилизацию любых тканей, медицинских устройств или частей тела, которые могут быть удалены в ходе операции.

8. Я осознаю, что существуют потенциальные значительные риски для моего здоровья при использовании продуктов крови, и я даю согласие на их использование, если мой хирург либо его/ее ассистенты сочтут это необходимым.

9. Я осведомлен(-а) о стоимости медицинских услуг, связанных с операцией, и эта стоимость меня устраивает.

10. Я понимаю, что могу отказаться от операции.

Я ознакомлен(-а) с особенностями предстоящей операции, планом хирургического лечения, расположением рубцов, особенностями

Пациент: _____



Информированное согласие – эстетическая блефаропластика

восстановительного периода, возможными осложнениями и рисками, альтернативными методами лечения, полностью осознаю содержание и назначение данного документа, даю свое согласие на операцию и обязуюсь выполнять все рекомендации врача.

Дата: _____

ФИО пациента: _____

Подпись пациента _____

Пациент: _____